EVALUATION DES CO-MORBIDITES NON INFECTIEUSES *(recommandations EACS – novembre 2009)*

	Evaluation	Au moment du diagnostic	Avant le début du traitement	Fréquence du suivi	
				Sous traitement	Sans traitement
Histoire	▪ Co-morbidités passées et actuelles ▪ Antécédents familiaux (maladie cardiovasculaire précoce, diabète, hypertension, maladie rénale chronique) ▪ Médicaments associés ▪ Mode de vie (alcool, tabac, alimentation, exercice physique)	+ + + +	+ + + +	Chaq. cons. /6-12 mois	Chaq. cons. /1 an
Composition corporelle	▪ Index de masse corporelle ▪ Lipodystrophie clinique	+ +	+ +	/1 an /1 an	/1 an /1 an
Maladie cardiovasculaire	▪ Evaluation du risque (score de Framingham) ▪ ECG	+ +	+	/1 an	/1 an
Hypertension	▪ Pression artérielle	+	+	/1 an	/1 an
Dyslipidémie	▪ Cholestérol total, HDL-c, LDL-c, triglycérides	+	+	/1 an	
Diabète	▪ Glycémie	+	+	/6-12 mois	
Maladie hépatique	▪ Evaluation du risque ▪ ALAT, ASAT, phosphatases alcalines	+ +	+ +	/1 an /3-6 mois	/1 an /6-12 mois
Maladie rénale	▪ Evaluation du risque ▪ Débit de filtration glomérulaire estimé (MDRD) ▪ Bandelette urinaire	+ + +	+ + +	/1 an /3-6 mois /1 an	/1 an /6-12 mois /1 an
Maladie osseuse	▪ Evaluation du risque (FRAX® si > 40 ans) ▪ 25-OH vitamine D	+ +	+	/2 ans	/2 ans
Troubles neurocognitifs	▪ Questionnaire	+	+	/1-2 ans	/1-2 ans
Dépression	▪ Questionnaire	+	+	/1-2 ans	/1-2 ans
Cancer	▪ Mammographie (femme, 50-70 ans) ▪ Frottis cervical (femme, période d'activité génitale) ▪ Autres			/1-3 ans /1-3 ans	/1-3 ans /1-3 ans

Score de Framingham : www.cphiv.dk/TOOLS/Framingham/tabid/302/Default.aspx

Débit de filtration glomérulaire estimé : www.cphiv.dk/TOOLS/GFR/tabid/301/Default.aspx

Score FRAX® : www.shef.ac.uk/FRAX/tool_FR.jsp