



Prévention de l'infection à VIH

Le rôle des associations

Marie SUZAN

AIDES Rhône-Alpes-Méditerranée



Le rôle des associations

- Complémentaire à celui des soignants
- Partie intégrante de la prise en charge globale des personnes atteintes
- Les associations interviennent principalement par des actions qui s'articulent et se déclinent autour
 - Du soutien des personnes
 - De la prévention et de la réduction des risques



Les actions de soutien

- Le soutien doit favoriser l'accès aux soins, les conditions pour une bonne observance et améliorer la qualité de vie
 - Soutien individuel toujours nécessaire
 - Mais il est nécessaire aujourd'hui de favoriser la parole collective autour du VIH
 - ressourcements, WE thérapeutiques, université des personnes en traitement...
 - ateliers estime de soi...
 - groupes de parole...
- Les actions de soutien renforcent les capacités des personnes à se protéger et à développer leurs propres stratégies de prévention (réduction des risques)



Le rôle des associations dans la prévention

- Trois niveaux de prévention
 - 1 grand public: rôle des pouvoirs publics
 - 2 publics ciblés
 - 3 individuel avec vocation de transformer ce niveau et lui donner une dimension collective et communautaire
- Ciblage nécessaire des publics prioritaires: gays, migrants, consommateurs de produits notamment les injecteurs, personnes infectées



Constats et difficultés

Données épidémiologiques françaises (INVS)

- 100 000 à 130 000 personnes vivent avec le virus
- Environ 6300 nouvelles contaminations par an
- Les rapports hétérosexuels représentent le mode principal de contamination : 55% du total
- La moitié des nouvelles contaminations par voie hétérosexuelle concernent des personnes de nationalité d'un pays d'Afrique subsaharienne

Constats et difficultés

- Le discours tout préservatif pour tout le monde est un échec
 - Lassitude de l'utilisation du préservatif masculin, non-adaptation de l'outil dans les relations de couple au long cours
 - Séro-triage plus ou moins conscient dans le choix des partenaires
 - Difficulté à négocier l'usage du préservatif, en particulier pour les femmes
 - Méconnaissance et manque d'accessibilité de certains de ces outils
 - Par exemple : mise à disposition et coût du Femidom



Le rôle des associations dans la prévention

- Améliorer l'accès à la prévention et aux outils actuels pour les publics les plus à risques
- Faire pression pour diversifier la palette des outils de prévention pour les promouvoir ensuite
 - Actions de lobby et de plaidoyer

Quels nouveaux outils espérer et avec quels délais?



MICROBICIDES

- A l'initiative des femmes
- Prévention de l'infection par l'application vaginale de composés chimiques
- Microbicides contenant des ARV
 - Plus spécifiques et de plus longue durée
- Début des recherches pour une utilisation rectale
- Efficacité démontrée dans un modèle animal
- Cinq produits en essais cliniques
 - Un essai arrêté à cause de résultats contraires
 - Quel avenir pour les autres essais?



Barrières cervicales

- A l'initiative des femmes
- Contraceptif sûr et efficace
- Etudes observationnelles montrent la réduction des IST
- La protection du col de l'utérus pourrait réduire l'infection



Circoncision

- Données biologiques sur le risque plus faible
 - Élimination de cellules cibles de l'infection
 - Épaississement de la muqueuse ► réduction des IST
- Données épidémiologiques
 - Plus faible prévalence de l'infection à VIH chez les hommes circoncis
- Méta-analyse
 - 38 études associent la circoncision à un plus faible risque pour le VIH
- Mais quelle acceptabilité?




Traitement pré-exposition

- Prouvé dans le cas de la malaria, et de la transmission mère-enfant dans le cas du VIH
- ARV candidats : Tenofovir, Truvada
 - Molécules bien supportées
 - Prise en une fois par jour
- Problèmes
 - Infections avec des virus résistants – options thérapeutiques?
 - Niveau d'adhérence requis?
 - Gestion des effets secondaires?
 - Acceptation d'un traitement chronique par des personnes saines?
 - Mésusage




Traitement anti-HSV2

- L'infection à HSV2 augmente de 2 fois le risque d'infection à VIH et de 5 fois le risque de transmission du VIH
- L'infection à HSV2 est associée avec une charge virale VIH plus élevée
- L'infection à VIH influe sur l'histoire naturelle de l'infection à HSV2
- Problèmes
 - Niveau d'adhérence requis?
 - Traitement continu / épisodique?
 - Emergence de HSV2 résistants?



Quoi faire en attendant la mise à disposition de ces nouveaux outils?

- Pour la réduction des risques liés à la consommation de produits psychoactifs :
 - Connaissance et reconnaissance des outils de prévention comme le Strawbag, le kit piercing
 - Expérimenter des programmes d'éducation à l'injection
 - Obtenir l'ouverture de PES en prison




Quoi faire en attendant la mise à disposition de ces nouveaux outils?

- Pour la réduction des risques sexuels
 - Améliorer la mise à disposition et diminuer le coût du préservatif féminin pour le rendre aussi accessible que le préservatif masculin
 - Améliorer l'offre de dépistage
 - Harmoniser le discours sur le délai du dépistage
 - Elargir l'offre de dépistage (proposition systématique du dépistage lors d'un bilan de santé)
 - Dépistage hors les murs
 - Expérimentation des test rapides
 - Avis du CNS en novembre 2006
 - Position de la ministre de la santé en novembre 2007

Quoi faire en attendant la mise à disposition de ces nouveaux outils?

- L'accès au traitement pour tous comme outil de prévention
 - Le risque de transmission est très fortement diminué chez les personnes ayant une charge virale indétectable
 - Plaidoyer pour un accès généralisé et gratuit aux traitements ARV



% des besoins en traitement couverts
OMS 2005

● ● ● | Mais surtout : Ne pas faire reculer la
prévention et la réduction des
risques!

- La prévention et la RdR reculeront si
 - la transmission du VIH est pénalisée
 - les personnes étrangères en situation irrégulière sont rendues invisibles
 - les personnes séropositives continuent d'être stigmatisées
 - les personnes séropositives sont maintenues dans de mauvaises conditions de vie socio-économiques
 - la loi met des bâtons dans les roues des acteurs de prévention



C'EST LE SIDA QU'IL FAUT EXCLURE, PAS LES SÉROPOSITIFS.

