

FEDERATION DES RESEAUX VILLE-HOPITAL DE MARSEILLE

Journée Mondiale de Lutte contre le SIDA

TRANSMISSION et DEPISTAGE du V.I.H. et des PATHOLOGIES ASSOCIEES

1° Décembre 2009


Dr S. MOKHTARI



L'EPIDEMIE VIH/SIDA

DANS LE MONDE

- On estime à 33,4 millions le nombre de personnes vivant avec le VIH/SIDA et à 2,7 millions celui des nouvelles infections annuelles.
- Le VIH/sida est la première cause de mortalité dans le monde chez les femmes en âge de procréer.

- 
- The background of the slide features a faint, blue-tinted image of classical architectural columns, possibly from a government building or a historical site, which adds a sense of authority and formality to the presentation.
- **Le dépistage précoce** « permet l'instauration d'un traitement anti rétroviral dont l'efficacité sur la réduction de la morbidité et de la mortalité a été démontrée »;
 - La haute autorité de santé préconise un dépistage généralisé du VIH.
- « Non pas un dépistage systématique et obligatoire mais le proposer de plus en plus systématiquement »

Les chiffres clés dans le monde (1)

Estimation à fin 2008

🚫 Nombre total de personnes vivant avec le VIH : 33.4 millions

- *Depuis 1981, 65 millions de personnes ont été infectées par le VIH*

🚫 Personnes nouvellement infectées par le VIH pendant l'année 2008 : 2.7 millions

- *7 400 cas par JOUR*


🚫 Décès liés au sida en 2008 : 2.0 millions

- *5 500 cas par JOUR*




EN FRANCE

- En France , l'épidémie VIH se caractérise par une prévalence basse dans la population générale.
- une prévalence plus élevée et hétérogène (de niveau mal connu) dans les populations immigrées d'Afrique subsaharienne
- une prévalence forte chez les homosexuels masculins.

- 
- Le nombre de nouvelles infections a reculé de 17% en huit ans depuis 2001 date de la signature de la déclaration d'engagement des Nations Unies.
 - « Au delà du pic et de l'évolution naturelle de la maladie, les programmes de prévention apportent un réel changement »

- « la bonne nouvelle , c'est que Nous avons des preuves que les baisses que nous observons sont dues au moins en partie, à la prévention ».
- Le dépistage et le traitement sont des outils majeurs de réduction des risques
- Les thérapies antirétrovirales ont aussi eu un effet significatif pour la prévention des nouvelles infections.

- 
- The background of the slide features a faint, blue-tinted image of classical architectural columns, possibly from a grand building or temple, creating a sense of history and authority.
- **Limite du dispositif de dépistage actuel :**
 - 40000 personnes ignorent leur infection et 33% des patients ne sont pris en charge que tardivement à l'hôpital.
 - Il faut repenser les stratégies de dépistage avec comme objectif un dépistage large et précoce.
 - Développer de nouvelles techniques de dépistage...



N'OUBLIONS PAS :

- Le 1^o décembre s'inscrit dans un climat particulier de pandémie grippale qui rappelle la fragilité des personnes vivant avec le VIH, rapidement identifiées à risque et donc à vacciner en priorité.
- Les indications à la vaccination et le nombre de personnes concernées montrent que l'état immunitaire des personnes vivant avec le VIH continue à s'améliorer
- Beaucoup croyaient être exclus du processus de vaccination.