

**A l'occasion de la Journée
mondiale de lutte contre le sida
du 1^{er} décembre 2009**




L'épidémie à VIH en France et en Paca



Dr Patricia Enel, Cellule Santé Publique Dmi2, AP-HM




Les personnes nouvellement contaminées par le VIH en France en 2008

-  **7 000 personnes contaminées par le VIH en France en 2008**
-  **Cette année, l'Institut de Veille Sanitaire applique une nouvelle méthode pour estimer l'incidence de l'infection à VIH, à partir des données des tests d'infection récente (moins de 6 mois)**
-  **Incidence (nombre de nouveaux cas) calculée pour toute la population et dans différents sous groupes**

Source : InVS




Les tendances de l'épidémie en France en 2008 (1)

- 🚫 **Tendance globale à la baisse depuis 2003**
- 🚫 **Taux d'incidence globale estimé à 17 nouvelles contaminations pour 100 000 personnes de 18-69 ans**
- 🚫 **Quasi totalité des contaminations = contamination sexuelle**



Source : InVS

Les tendances de l'épidémie en France en 2008 (2)


-  **Baisse de l'incidence pour les contaminations hétérosexuelles, quels que soient le sexe et la nationalité**
-  **Incidence la plus basse pour la population hétérosexuelle française = 5 pour 100 000**
-  **Incidence stable et basse chez les usagers de drogue injectable, mais 9 fois supérieure à celle chez les personnes hétérosexuelles**

Les tendances de l'épidémie en France en 2008 (3)

🚫 Transmission élevée chez les hommes homosexuels, sans baisse entre 2003 et 2008

🚫 Incidence chez les homosexuels = 200 fois plus élevée que chez les personnes hétérosexuelles

(valeurs centrales des estimations ; HET ETR : Hétérosexuels étrangers ; HET FRA : Hétérosexuels français ; UDI : Usagers de drogues par voie intraveineuse ; HSH : Hommes ayant des relations sexuels avec des hommes)



Source : InVS

Les taux d'incidence de l'infection à VIH par groupe de population en France en 2008

Mode de transmission	Sous-population (18-69 ans)	Nombre de nouvelles contaminations (IC95%)	Effectif estimé de la population	Taux d'incidence pour 100 000 (IC95%)
Hétérosexuel	Femmes françaises	810 (620-1000)	18 363 590	4 (3-5)
	Hommes français	1140 (830-1440)	18 848 440	6 (4-8)
	Femmes étrangères	940 (700-1180)	1 739 760	54 (40-68)
	Hommes étrangers	660 (460-870)	1 884 740	35 (24-46)
Homosexuel		3320 (2830-3810)	329 950	1006 (857-1155)
Usage de drogues IV		70 (0-190)	81 000	91 (0-237)
Total		6940 (5430-8500)	41 247 480	17 (13-21)


(sources des effectifs de population : Estimations de population au 1^{er} janvier 2008. Insee ; Contexte de la sexualité des français. Inserm, Ined; Prévalence de l'usage problématique de drogues en France – Estimations 2006. OFDT)



INSTITUT
DE VEILLE SANITAIRE

Source : InVS

Répartition des découvertes de séropositivité selon l'âge et le sexe en France




- 🚫 Les femmes se contaminent et/ou se dépistent plus tôt que les hommes
- 🚫 Chez les 20-29 ans, les femmes sont majoritaires (54% des nouvelles contaminations). Chez les plus de 29 ans, les hommes sont majoritaires

Source : CRIPS Paca

Les tendances de l'épidémie en Provence Alpes Côte d'Azur (Paca)


- Epidémie persistante et active, plaçant Paca toujours parmi les régions très concernées par l'épidémie
- Les 2 départements les plus touchés :
 - Alpes Maritimes
 - Bouches du Rhône
- Le nombre de nouvelles contaminations reste important, principalement par relations hétérosexuelles
- Les contaminations par relations homosexuelles progressent

Les tendances de l'épidémie en Provence Alpes Côte d'Azur (Paca)




- 🚫 Les rapports hétérosexuels représentent 51% des découvertes de séropositivité au VIH en 2008
- 🚫 Les découvertes de séropositivité au VIH liées à des relations homosexuelles ont une tendance à la hausse
- 🚫 Celles liées à l'usage de drogue injectable sont toujours en baisse

Les tendances de l'épidémie en Provence Alpes Côte d'Azur (Paca)



- Les hommes sont majoritaires dans toutes les tranches d'âge, notamment chez les plus de 29 ans
- Les femmes représentent 39% des découvertes de séropositivité chez les 20-29 ans

Répartition des découvertes de séropositivité selon l'âge et le sexe en Paca



- 🚫 La part des dépistages tardifs est plus basse en Paca qu'en France
- 🚫 Mais cette part est en augmentation depuis 2002, liée notamment aux modifications de la répartition des modes de transmission

Sources

Institut de veille Sanitaire :

http://www.invs.sante.fr/display/?doc=presse/2009/communiqués/incidence_vih191109/index.html



CRIPS Paca : <http://paca.lecrips.net/>

CRIPS

Provence - Alpes - Côte d'Azur

